

## A. Pogostnost vzorčenja klavnih trupov govedi, prašičev, ovac, koz in kopitarjev

Letni obseg zakola	Pogostnost vzorčenja*	
	Začetna pogostnost	Zmanjšana pogostnost v primeru ugodnih rezultatov
od 1.000 do vključno 7.000 goved oziroma kopitarjev	<b><u>Enterobakterije in SŠMO:</u></b> 5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored	<b><u>Enterobakterije in SŠMO:</u></b> 5 trupov enkrat na mesec
od 4000 do vključno 15.000 prašičev oziroma ovc oziroma koz	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 trupov enkrat na mesec
od 100 do vključno 1.000 goved oziroma kopitarjev	<b><u>Enterobakterije in SŠMO:</u></b> 5 trupov vsake 3 mesece	
od 1.000 do vključno 4.000 prašičev oziroma ovc oziroma koz	<b><u>Salmonela:</u></b> vzorčenje ni potrebno	
od 100 do vključno 1.000 prašičev, ovc, koz oziroma kopitarjev	<b><u>Enterobakterije in SŠMO:</u></b> 5 trupov vsakih 6 mesecev	
	<b><u>Salmonela:</u></b> vzorčenje ni potrebno	
do vključno 100 prašičev goved, ovc, koz oziroma kopitarjev	<b><u>Enterobakterije, SŠMO, Salmonela</u></b> Vzorčenje ni potrebno	

\* vzorčenje je treba izvajati ločeno za vsako posamezno živalsko vrsto

## B. Pogostnost vzorčenja klavnih trupov brojlerjev in puranov

Letni obseg zakola	Pogostnost vzorčenja	
	Začetna pogostnost	Zmanjšana pogostnost v primeru ugodnih rezultatov
od 100.000 do vključno 1.000.000 brojlerjev	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 vzorcev na vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 vzorcev 1 x mesečno
od 10.000 do 100.000 puranov	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 vzorcev na vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 vzorcev 1 x mesečno
od 5.500 do vključno 100.000 brojlerjev	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 vzorcev 3 x letno	
od 5.500 do 10.000 puranov	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 vzorcev 3 x letno	
do vključno 5.500 brojlerjev	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 vzorcev 1 x letno	
do vključno 5.500 puranov	<b><u>Salmonela:</u></b> 5 vzorcev 1 x letno	